



## Die Saison beginnt: Zecken

**WICHTIG ZU WISSEN: Zecken leben NICHT auf Bäumen!**

**Sie leben und lauern im Gras! 0 - maximal 80cm ab Boden.**



Achten Sie jetzt besonders auf Zecken im Fell bei Ihrem Tier, da in den ersten warmen Tagen die ausgehungerten Blutsauger auf Beute lauern. Die Zecke überträgt mit ihrem Speichel, welchen sie zur Blutgerinnung in ihre Opfer pumpen, verschiedene, z.T. tödlich verlaufende Krankheiten auf Menschen und Tiere.

Suchen Sie sich und Ihr Tier nach Spaziergängen/Ausritten nach Zecken ab und vernichten Sie die Blutsauger sogleich. Eine aktuelle Untersuchung hat ergeben, dass Zecken nicht länger als 5 Minuten bei 130 bis 180 Grad Celsius überleben können.

Sollte sich bei Ihnen oder Ihrem Tier trotzdem eine Zecke festgebissen haben, dann entfernen Sie diese fachgerecht mit einer professionellen Zeckenzange oder lassen das Insekt von Ihrem Arzt/Tierarzt entfernen. Bissstelle sofort desinfizieren und in den folgenden Stunden/Tagen die Bissstelle beobachten und Körpertemperatur messen. Bei Anstieg der Temperatur sofort Arzt/Tierarzt kontaktieren.

### VORBEUGEN

Nach dem Spaziergang/Ritt und **vor Betreten** des Hauses/Stall, sich und die Tiere absuchen. Bei **Hunden** empfehlen wir als Schutz das Zecken- und Flohschutzband **SCALIBOR** oder Spot-on **ADVOCATE, FRONTLINE ODER EXSPOT**.

Bei **Pferden** raten wir vor Abritten ins Gelände Hufe bis Ellbogenhöhe/Kniegelenke mit einem Insektenschutz zu besprühen. **Horse Fly Repellent von Primeur** können wir bei Pferden empfehlen, da dies auch von empfindlichen Tieren gut vertragen wird.

**Alternative Möglichkeiten:** vor dem Ritt/Spaziergang einige Tropfen Geranien- oder Eukalyptusöl auf sich und dem Tier verteilen.

**ACHTUNG!** Diese hochkonzentrierten Öle werden allerdings von den meisten Hauttypen (Mensch und Tier) schlecht vertragen und oft sind anschließende Hautausschläge zu verzeichnen.

### VON ZECKEN UEBERTRAGENE KRANKHEITEN BEI MENSCH UND TIER

**Anaplasmosse:** Die Zeit zwischen Infektion und ersten Symptomen beträgt 4-11 Tage

**Babesiose:** Die Übertragungszeit beträgt 48-72 Stunden

**Borreliose:** Die Übertragungszeit beträgt 16-72 Stunden

**Ehrlichiose (Rickettsiose)** Die Inkubationszeit beträgt 7-15 Tage.

**Zeckenzephalitis:** Die Inkubationszeit kann bis 14 Tagen betragen. I.d.R. Fieber nach 12 bis 48 Std.

**Schützen Sie sich und Ihre Liebsten!**